

Anafylaxie na vaccinatie

VOORBEREIDING

NOODMEDICATIE

- min. 2 ampullen adrenaline 1mg/ml
- Salbutamol puffer
- Levocetirizine 5mg comprimé
- Methylprednisolone 125 mg (IV)
- min. 2x500ml NaCl 0.9%
- zuurstof (fles 2liter/200 bar)

MATERIAAL

- stethoscoop + bloeddrukmeter + O2-saturatiemeter
- beademingsballon met masker
- voorzetskamer voor puffer met masker: Aerochamber Plus A/static+flow-vu-mask Adult
- zuurstoffles met ontspanner, zuurstofleiding, -masker met en zak
- materiaal voor IV lijn (infuusnaald, leiding met driewegkraan, tourniquet, kleefpleister, alcoholswab)
- spuit 5cc, optreknaald, SC naald (i.f.v. toediening Solumedrol)
- telefoon (bel 112 voor MUG-oproep melding 'anafylaxie') met 112-app
- automatisch externe defibrillator

Voorzie vaccinatie en EHBO-lokaal dat bereikbaar zijn voor dringende hulpverlening
Plaats patiënt in een zittende of liggende houding (wees bedacht op bloeddrukval)

OBSERVATIE i.k.v. ANAFYLAXIE

DERMATOLOGISCH

- **zwellings** gelaat, keel, mondmucosa
- huiduitslag
- flushing (=roodheid)

CARDIOVASCULAIR

- **plots tachycardie (= snelle pols)**
én hypotensive (= lage bloeddruk)
- retrosternale pijn
- bewustzijnsverlies
- hartstilstand
- draaiduizeligheid

RESPIRATOIR

- **plots heesheid**
- **plotse wheezing (=bemoelijkte en/piepende ademhaling)**
- droge hoest
- benauwdheid
- kortademigheid

GASTRO-INTESTINAAL

- misselijkheid
- braken
- diarree
- abdominale krampen

ANAFYLAXIE

=

Dermatologische + MINSTENS 1 respiratoire of cardiovasculair symptoom

OF

MINSTENS 2 dermatologische, respiratoire of gastro-intestinale symptomen

Aanpak van anafylaxie na vaccinatie

